N 1

$$\begin{cases} x - \frac{1}{y} = 0 \\ y - \frac{1}{x} = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} xy - 1 = 0 \\ xy - 1 = x \end{cases} \Rightarrow x = 0$$

$xy - 1 = 0$

$xy = 1$

$y = \frac{1}{x} = 0$

б) $\begin{cases} x - \frac{1}{y} = k \mid \cdot y \\ y - \frac{1}{x} = 2 \mid \cdot x \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} xy - 1 = y \\ xy - 1 = 2x \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} xy = y + 1 \\ xy - 1 = 2x \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{y+1}{y} \\ xy - 1 = 2x \end{cases}$

$\frac{y+1}{y} \cdot y - 1 = 2 \cdot \frac{y+1}{y}$

$y + 1 - 1 = \frac{2y+2}{y}$

$y = \frac{2y+2}{y} \quad | \cdot y$

$y^2 = 2y + 2$

$y^2 - 2y - 2 = 0$

$D = (-2)^2 - 4 \cdot (-2) \cdot 1 = 4 + 8 = 12$

$y_{1/2} = \frac{2 \pm 2\sqrt{3}}{2} = \frac{2(1 \pm \sqrt{3})}{2} = 1 \pm \sqrt{3}$

$x_1 = \frac{1+\sqrt{3}+1}{1+\sqrt{3}} = \frac{2+\sqrt{3} \cdot (1-\sqrt{3})}{1+\sqrt{3} \cdot (1-\sqrt{3})} = \frac{2 - 2\sqrt{3} + \sqrt{3} - 3}{1 - \sqrt{3} + \sqrt{3} - 3} = \frac{-1-\sqrt{3}}{-2} = \frac{1+\sqrt{3}}{2}$

$x_2 = \frac{1-\sqrt{3}+1}{1-\sqrt{3}} = \frac{(2-\sqrt{3})(1+\sqrt{3})}{(1-\sqrt{3})(1+\sqrt{3})} = \frac{2 + 2\sqrt{3} - \sqrt{3} - 3}{1 + \sqrt{3} - \sqrt{3} - 3} = \frac{-1+\sqrt{3}}{-2} = \frac{1-\sqrt{3}}{2}$

$x_{1/2} = \frac{1 \pm \sqrt{3}}{2}$

№2

а) $X : 12 = 4a + 7$

$X : 42 = a + 11$

$\Rightarrow \begin{cases} (X-7) : 12 = 4a \\ (X-11) : 42 = a \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} X-7 = 48a \\ X-11 = 42a \end{cases}$

$X \underset{12}{\equiv} 7$ $\quad X \underset{42}{\equiv} 11$

$\begin{cases} X = 48a + 7 \\ X = 42a + 11 \end{cases}$

$48a + 7 = 42a + 11$

$6a = 4$

$a = 1$

$X - 7 = 7 - 7$ $\quad X - 11 = 11 - 11$

$X - 7 = 0$ $\quad X - 11 = 0$

$X = 55$

$X = 53$

Мұндай натурал сан табылмайды.

б) $X : 11 = a + 7$

$X : 42 = b + 11$

$\Rightarrow X : 11 = 4b + 7$

$X : 42 = 4b + 11$

$42 : 11 = 3,81 \approx 4$

№3

а) $h = 2,\ h = 3,\ h = 7$ б) $h = 3,\ h = 4,\ h = 1$

Тең қабырғалы үшбұрышта биіктік, медиана және алады. Бұл үшбұрышта биіктегі өз ара тең болуы міс.

Тең бүйірлі үшбұрышта екі бүйір қабырғасына түсірілген биіктік тең болуы керек. Тік төртбұрыштың биіктігі және алынуы мүмкін тең болуы керек.



$BN^2 = BA^2 - AN^2$

$BN^2 = 7^2 - 2^2 = 49 - 4 = 45$

$BN = \sqrt{45} = 3\sqrt{5}$

$NC^2 = AC^2 - AN^2$

$NC^2 = 3^2 - 2^2 = 9 - 4 = 5$

$NC = \sqrt{5}$

$BC = BN + NC = 3\sqrt{5} + \sqrt{5} = 4\sqrt{5}$

№7

$$\begin{cases} x:11=a+7 \\ x:42=b+11 \end{cases} = \begin{cases} x:11=4b+7 \\ x:42=b+11 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x-7:11=4b \\ x-11:42=b \end{cases}$$

$42:11=3,81 \approx 4$

$$\begin{cases} x-7=44b \\ x-11=42b \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=44b+7 \\ x=42b+11 \end{cases}$$

$44b+7=42b+11$

$2b=4$

$b=2$

$x=44\cdot 2+7$ $\quad$ $x=42\cdot 2+11$

$x=88+7=95$ $\quad$ $x=84+11=95$

Тәбиғаи.

№3

а)



$NC^2=AC^2-AN^2$

$NC^2=4^2-3^2=16-9=7$

$NC=\sqrt{7}$

$BN^2=AB^2-AN^2$

$BN^2=6^2-3^2=36-9=27$

$BN=\sqrt{27}=3\sqrt{3}$

$BC=3\sqrt{3}+\sqrt{7}$

1. а) $\begin{cases} x - \frac{1}{y} = 0 \\ y - \frac{1}{x} = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{1}{y} \\ y - \frac{1}{\frac{1}{y}} = y - \frac{y}{1} = 1 \end{cases}$ $y - y = 0$ $y - y \neq 1$ болмайды.

б) $\begin{cases} x - \frac{1}{y} = 1 \\ y - \frac{1}{x} = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{1}{y} = 1 - x \\ y - \frac{1}{x} = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{1}{y} = x - 1 \\ y - \frac{1}{x} = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = \frac{1}{x-1} \\ \frac{1}{x-1} - \frac{1}{x} = 2 \end{cases}$

$\frac{x - 1(x-1) - 2x(x-1)}{x(x-1)} = x - x + 1 - 2x^2 + 2x = -2x^2 + 2x + 1 = 0$ $2x^2 - 2x - 1 = 0$

$y = \frac{1}{x-1}$ $y_1 = \frac{1}{\frac{1-\sqrt{3}}{2} - 1} = \frac{1}{\frac{-1-\sqrt{3}}{2}} = \frac{2}{-1-\sqrt{3}}$

$D = 4 - 4 \cdot 2 \cdot (-1) = 12$

$x_{1/2} = \frac{2 \pm \sqrt{12}}{4}$

$y_2 = \frac{1}{\frac{1+\sqrt{3}}{2} - 1} = \frac{1}{\frac{-1+\sqrt{3}}{2}} = \frac{2}{\sqrt{3}-1}$

$x_{1/2} = \frac{2 \pm 2\sqrt{3}}{4} = \frac{2(1 \pm \sqrt{3})}{4} = \frac{1 \pm \sqrt{3}}{2}$

$x_1 = \frac{1+\sqrt{3}}{2}$ $y_1 = \frac{1}{-1-\sqrt{3}}$

$x_2 = \frac{1+\sqrt{3}}{2}$ $y_2 = \frac{2}{\sqrt{3}-1}$

$x_1 = \frac{1-\sqrt{3}}{2}$ $x_2 = \frac{1+\sqrt{3}}{2}$

2. а) болмайды.

б) $\begin{cases} n : 11 = x \text{ 7 қалады} \\ n : 42 = x \text{ 11 қалады} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{n-7}{11} = x \\ \frac{n-11}{42} = x \end{cases}$ $n = 95$

3. а)



$S = \frac{1}{2} \cdot a \cdot h_a$

$a = \frac{S}{\frac{1}{2} \cdot h_{a;b,c}}$

$a = \frac{6}{\frac{1}{2} \cdot 2} = 6$

$S = \frac{a+b+c}{2} = \frac{2+3+7}{2} = 6$

$b = \frac{6}{\frac{1}{2} \cdot 3} = 4$

$c = \frac{6}{7 \cdot \frac{1}{2}} = 2$

б) $S = \frac{3+4+6}{2} = 6,5$

$a = \frac{6,5}{\frac{1}{2} \cdot 3} = \frac{6,5}{1,5}$

$b = \frac{6,5}{\frac{1}{2} \cdot 4} = 3,25$

$c = \frac{6,5}{\frac{1}{2} \cdot 6} = \frac{6,5}{3}$

1 есеп.

8) $\begin{cases} x - \frac{1}{y} = 1 \\ y - \frac{1}{x} = 2 \end{cases}$

$x = 1 + \frac{1}{y}$ $\quad x = \frac{1}{y-2}$

$\frac{y+1}{y} = \frac{1}{y-2}$

$y = (y+1)(y-2)$.

$y = y^2 - 2y + y - 2$

$y^2 - 2y - 2 = 0$.

$D = 4 - (4 \cdot (-2) \cdot 1) = 12 = 2\sqrt{3}$

$y_{1/2} = \frac{2 \pm 2\sqrt{3}}{2} = \frac{2(1 \pm \sqrt{3})}{2} = 1 \pm \sqrt{3}$

$y_1 = 1 + \sqrt{3} - \frac{1}{x} = 2$

$1 + \sqrt{3} - 2 = \frac{1}{x}$

$\sqrt{3} - 1 = \frac{1}{x}$

$x_1 = \frac{1}{\sqrt{3}-1}$

$y_2 = 1 - \sqrt{3} - \frac{1}{x} = 2$

$1 - \sqrt{3} - 2 = \frac{1}{x}$

$-1 - \sqrt{3} = \frac{1}{x}$

$x_2 = -\frac{1}{\sqrt{3}+1}$.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ОҚУ-АҒАРТУ МИНИСТРЛІГІНІҢ
ҰЛТТЫҚ РЕСТЕСТЕУ ОРТАЛЫҒЫ ҰЛТТЫҚ ТЕСТІЛЕУ ОРТАЛЫҒЫ
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК ҚАЗЫНАЛЫҚ ҚҰЖАТЫ

2 есеп

б) $42 \cdot 2 = 84$ $95 : 42 = 2$ (11қ).

$84 + 11 = 95$ $95 : 11 = 8$ (7қ) 1 (мысал).

сан табыла алмайды.

а) сан табыла алмайды. Өйткені егер 42-ні қандайда бір санға көбейтіп оған 11-ді қосып, 7-ті-ні азайтқанда 12-ге санға бөлінбейтін сандар шығады ±2 қалдық қалады. Мысалы:

$42 \cdot 12 = 504$. $42 \cdot 2 = 84$

$504 + 11 = 515$ $84 + 11 = 95$

$515 - 7 = 508$ $95 - 7 = 88$

$508 : 12 = 42$ (2қалдық) $88 : 12 = 4$ (2қалдық)

1 есеп

а) $\begin{cases} x - \frac{1}{y} = 0 \,/\, y \\ y - \frac{1}{x} = 1 \,/\, x \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} xy - 1 = 0 \\ xy - 1 = x \end{cases} \Rightarrow xy = 1.$

$1 - 1 = x$

$x = 0$. Бөлшектің алымында 0 бола алмайды $\varnothing$.

$y - \frac{1}{0} = 1$ $\varnothing$.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ОҚЫТУ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
"ҰЛТТЫҚ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ТЕСТІЛЕУ ОРТАЛЫҒЫ"
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК ҚАЗЫНАЛЫҚ КӘСІПОРЫНЫ

Ответ

а)



$3^2+x^2=7^2$

$9+x^2=49$

$x^2=40$

$x=\sqrt{40}$

$2\sqrt{40}+2\sqrt{40}+2\sqrt{40}=6\sqrt{40}$

$2\sqrt{10}+2\sqrt{10}=4\sqrt{10}$

$(4\sqrt{10})^2+3^2=$

$160+9=169=13$

б)



$4^2+x^2=6^2$

$16+x^2=36$

$x^2=20$

$x=\sqrt{20}=2\sqrt{5}$

$4^2+(2\sqrt{5})^2=16+20=36$

$\sqrt{86}$

$(4^2+2\sqrt{10})$

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІНІҢ
ҰЛТТЫҚ БІРЫҢҒАЙ ТЕСТІЛЕУ ОРТАЛЫҒЫ
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ДЕМЕУШІЛІК ҚАЗЫНАЛЫҚ ҚҰЖАТЫ

а) $x - \frac{1}{y} = 0$

$y - \frac{1}{x} = 1$

$x = \frac{1}{y}$

$y = \frac{1}{y} + 1$

$x = \frac{1}{x} + 1 \quad y = \frac{1}{y} + 1$

$x = x + 1 \quad y = y + 1$

б) $x - \frac{1}{y} = 1$

$y - \frac{1}{x} = 1$

$x = \frac{1}{y} + 1$

$y = \frac{1}{x} + 2$

$x = \frac{1}{x+2} + 1 \quad y = \frac{1}{y+2} + 1$

$x = x + 3 \quad y = y + 3$

2. 32 + 11 = 43. 42 + 11 = 16 - 16 = 26.

31, 43 — 53, 10.

55, 67, 79 — 95, 16.

Жауабы: жоқ

10, 16 .....

әр шағ ...

Бөлінетін шегінің бір...

42. 40 — шегінің жоқ

84. 82. — ...

126. 124. — ...

б). 11 · x + 7 = 42 · y + 11

y = 4x. y = 1

51 = 53.

88 + 7 = 84 + 11

95 = 95.

Жауабы: 95.

53 - 11 = 42

53 - 88 + 2

y : 2 - 2.

y = 2

3) а) жоқ

б) жоқ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ОҚУ-АҒАРТУ МИНИСТРЛІГІНІҢ
"ДАРЫН" РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ПРАКТИКАЛЫҚ ОРТАЛЫҒЫ
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК ҚАЗЫНАЛЫҚ КӘСІПОРНЫ

1) а) жауабы болмайды, шықпайды. $\begin{cases} x-\frac{1}{y}=0 \\ y-\frac{1}{x}=1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=\frac{1}{y} \\ y-\frac{1}{\frac{1}{y}}=1 \end{cases} \Rightarrow y-\frac{1}{y}=1$ → болмайды.

2) б) жауабы: 95 $42 \cdot 2 = 84$ осы бөлшекті қайтып 11 $84+11=95$ $95 : 12 = 8$ қалдығымен (7)

2) а) жауабы: (137 $42 \cdot 3 = 126 + 11 = 137$ $137 : 12 =$) болмайды.

1) б) $\begin{pmatrix} (x_1; y_1) = \left(\frac{1+\sqrt{3}}{2}; 1+\sqrt{3}\right) \\ (x_2; y_2) = \left(\frac{1-\sqrt{3}}{2}; 1-\sqrt{3}\right) \end{pmatrix}$ $x_1 \cdot x_2 \left(\frac{1-\sqrt{3}}{2}; \frac{1+\sqrt{3}}{2}\right)$ $y_1 \cdot y_2 \left(1+\sqrt{3}; 1+\sqrt{3}\right)$

3) а) бола алмайды, себебі 7 тың ұзын, 2 тың ұзына

3) б)



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БІЛІМ БЕРУ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
"ҚАРАҒАНДЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ" РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК ҚАЗЫНАЛЫҚ КӘСІПОРНЫ

1.

б)

$$\begin{array}{r} \times\; ABCDFT \\ 1001 \\ \hline ABCDFT \\ 000000 \\ 000000 \\ ABCDFT \\ \hline \end{array}$$

ABC(A+D)(B+F)(C+T)DFT деген сан шығады,

Біз бұл сан ОЛИМПИАДА санына тең болуы керек, сондықтан A=O; Л=B; C=И; A+D=M; B+F=П; C+T=И; D=A; F=Д және T=A

T мен D екеуі де A болғандықтан сан ABC((A+T)(B+F)(C+T)DFT ға айналады C+T=И және C=И болғандықтан T=0 болады

~~A, B, C сандары~~ A+D, B+F және C+T сандары 10 нан кем болуға тиіс. Осы формуладан біз 123173050 санын шығарады, онда ABCDFT= 123050, яғни болады:

$$\begin{array}{r} \times\; 123050 \\ 1001 \\ \hline 123050 \\ 000000 \\ 000000 \\ 123050 \\ \hline 123173050 \end{array}$$

123173050 шыға алады,

Бұл ~~есептің бір ғана~~ тапсырманың бір шешімі бар. 1=0 және M=1 болып келеді және біз ОЛИМПИАДА сөзі емес ОЛИМПИАДА шығады. O=1 Л=2 И=3 M=1 П=7 И=3 A=0 Д=5 A=0

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ "ДАРЫН" РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ПРАКТИКАЛЫҚ ОРТАЛЫҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК ҚАЗЫНАЛЫҚ КӘСІПОРНЫ

3.



$PX = RX$ болғандықтан, X нүктесі PR диагоналына перпендикуляр, ортасынан өтетін кесіндінің бойында жатады.

Бұл жерде кесінді SQ диагоналымен бірдей.

1) Егер $AB = 8$ онда $PA = 4 = OX + QX$, $OX = 3$

$\angle XOR = 90^\circ$ $\sqrt{XR^2 - OX^2} = OR = 4$ $PR = OR + OP = 8$, $PR = AB = 8$

∴ 8 қол қайтала шешімімізге 8 де.

Бірақ X нүкте өте алатын ой QS бойында.



$\angle PXR > 90^\circ$

$AQ = x = PA$

$XO^2 + OR^2 = 25$

$XO^2 = 25 - OR^2$

XO мен $OR \neq 0, 5$ $XO = OQ - 1$

$0 < XO, OR < 5$

$0 < OR < 5$

$XO \neq 1$ себебі

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ... «ДАРЫН» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ПРАКТИКАЛЫҚ ОРТАЛЫҒЫ

№3



Берілгені: ABCD - ромб,
P, Q, R, S сәйкесінше AB, BC, CD, DA қабырғаларының ортасы
X - ромб ішінде жатқан нүкте, XP = XR, XQ = 1, XP = 5 екені белгілі

а) XS-ті тап.

XQ // AB, CD

AP = PB = DR = RC, AD = BC => APRD = BCRP

J - X-қа сәйкес нүкте, SJ = 1

SJ // AB, DC

XR = PJ, XP = JR, PX = XR => PXRJ шаршы

$\angle JPX = 90° \Rightarrow XJ = \sqrt{5^2 + 5^2} = \sqrt{50} = 5\sqrt{2}$

$XS = XJ + 1 \Rightarrow XS = 5\sqrt{2} + 1$

б) AB < 8 екенін дәлелде

AB = SQ, $SQ = 5\sqrt{2} + 2$

SQ < 8

$5\sqrt{2} + 2 < 8$

$5\sqrt{2} < 6$

$\sqrt{50} \not< 6$

AB > 8

Парақтың артқы жағын толтырмаңыз / Обратную сторону листа не заполнять

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ОҚУ-АҒАРТУ МИНИСТРЛІГІ
ДАРЫНДЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ПРАКТИКАЛЫҚ ОРТАЛЫҒЫ
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫҚ ОЛИМПИАДАЛАР

№1. Олимпиада сөзіндегі әріптерді цифрларымен алмастырғанда алынған тоғыз таңбалы сан а) 999-ға, б) 1001-ге бөлінетіндей етіп алмастыруға бола ма?

ОЛИМПИАДА → О-1, Л-1, И-2, М-1, П-1, А-2, Д-1.

999 3ке бөлінетін сан, ал 1001-дің цифрларының қосындысы =2, сол себептен 1001 3ке бөлінбейді. Яғни, 999 бен 1001ге бөлінетін санды әріптерді әртүрлі цифрлармен (бірдейлерді бірдей) ортақ болу үшін алмастыруға болмайды.

Жауабы. Болмайды.

№3



ABCD - ромб.

$P = Q = R = S = \frac{a}{2}$

X - ромбтың ішінде жатқан нүкте

$XP = XR \leq 5$

$XQ = 1$

а) XS - ? б) $AB < 8$ екенін дәлелдеңіз

Шешуі.

а)

№1

Олимпиада есептері

а) 999-ға бөлінетін цифрлармен;

б) 1001-ге бөлінетін цифрлармен алмастыру

№2

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 сандары берілген.

1 жүрісте x және y сандарын өшіріп, орындарына $\frac{x-y}{\sqrt{2}}$ және $\frac{x+y}{\sqrt{2}}$ жазуға болады. Бірнеше жүрістен кейін

а) 1, 1, 3, 3, 4, 5, 7, 8 саны алына ма

б) 2, 2, 3, 3, 5, 6, 6, 9 саны алына ма?

№3



Берілгені:

ABCD - ромб

XP = XR = 5

XQ = 1

т/к: XS = ?

Шешуі:

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ОҚУ-АҒАРТУ МИНИСТРЛІГІНІҢ «ДАРЫН» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ПРАКТИКАЛЫҚ ОРТАЛЫҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК ҚАЗЫНАЛЫҚ КӘСІПОРНЫ

1 О Л И М П И А Д А

a b c d e c f g f

a) a b c d e c f g f : 999

б) a b c d e c f g f : 3003

Шешуі: a) a b c d e c f g f

9 7 9

3.





Берілгені:

AP = PB

BQ = QC

CR = RD

DS = SA

X ∈ ABCD

XP = XR = 5

XQ = 1

а) XS = ?

б) AB < 8 - дәлелдеу

Шешуі:

XP = XR = 5 =>

=> $X_2P = X_2R = 5$.

XQ = 1 => $X_2S = 3$

X_2 PX - теңбүйірлі ▵

X_2RX - теңбүйірлі ▵

PXR ▵ PSR - теңбүйірлі ▵

OR = 3,5

ORX : $OX = \sqrt{XR^2 - OR^2}$ =

= 3,5 = OX_2

$XS = OX + OX_2 + XS =$

= 3,5 + 3,5 + 1 = 8

Жауабы: XS = 8

3) тапсырма



$ABCD$ – ромб

P, Q, R, S – AB, BC, CD, DA қабырғаларының ортасы

$XP = XR = 5$

$XQ = 1$

$XS - ?$

$AB < 8?$

Егер X нүктесін ішкі сызылған шеңбердің центрі деп қарастырсақ

$XP = XR = 5$

$XQ = 1$

XQ – радиус

$XQ = XS = 1$

$XS = 1$

жауабы: $XS = 1$

2) тапсырма

$$\begin{cases} x - y = \sqrt{2}\,|\cdot| \\ \frac{x-y}{\sqrt{2}} = 2 \end{cases}$$

$x - y = 2\sqrt{2}$

$x = 2\sqrt{2} + y$

$\frac{x+y}{\sqrt{2}} = 2$

$x + y = 2\sqrt{2}$

$2\sqrt{2} + y + y = 2\sqrt{2}$

$2y = 0$

1) а.

О Л И М П И А Д А И = И А = А П ≠ О ≠ А ≠ Л ≠ И ≠ Д ≠ М

2сл) олимпиада | 999 ,

ИАДА ≡ 0 (mod 999)

т.к при 999 к к ∈ N (2-9)

то соблюдается закономерность X 99 У

⇓

ИАДА | 999

X 99 У | К

0

(1сл) олимпиада | 999 , если утверждение, что олимпи. ≡ 0 (mod 999), то АДА ≡ 0 (mod 999). Т.к. АДА - значное число, а минимальное делить 999, то АДА = 999 ⇒ А = Д что противоречит условию

⇒ А = Д, что противоречит условию

а) Нельзя

б)

Олимпиада | 1001

т.к при 1001 · к к ∈ N (1-9) всегда будет 4-зн. то рассмотрим

ИАДА ≡ 0 (mod 1001) при

к = 1 ИАДА | 1001 / 1 ⇒ А = Д = 0, А = Д = 1, И = А = 1

1001

0.

противоречит условия

б) Нельзя.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ОҚУ-АҒАРТУ МИНИСТРЛІГІ
"ҰЛТТЫҚ БІЛІМ БЕРУ ДАМЫТУ ОРТАЛЫҒЫ"
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК ҚАЗЫНАЛЫҚ КӘСІПОРНЫ

1) 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729, 1000

91 343 855 1729 1729

100 1729 1729

1229

x 2956

а) жоқ б) жоқ

2) $\cos(2^x) + \cos(2^{x+1}) = 0$ $\cos(2^x) = t$

$t + t \cdot \cos 2 = 0$

$t(1+\cos 2) = 0$

$t = 0$ $\cos 2^x = 0$

$\cos 2^x = \cos 2^0$

$x = 0$

б) $f(x) = \cos(2^x) + \cos(2^{x+1})$

$x \in (-\infty; 0)$ ↓

$(0; +\infty)$ ↑

3)



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ОҚУ-АҒАРТУ МИНИСТРЛІГІ
ҰЛТТЫҚ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ТЕСТІЛЕУ ОРТАЛЫҒЫ
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК ҚАЗЫНАЛЫҚ КӘСІПОРЫНЫ